

(11)

$R_l(r)$  verður þá að uppfylla  
radial jöfnuna

$$\left\{ \frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2} + k^2 - U(r) \right\} R_l(r) = 0$$

Ef  $rU(r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} C \in \mathbb{R}$  þá er lausnin

valin endanleg fyrir  $r=0$   $R_l \xrightarrow{r \rightarrow 0} Ar^l$

$\rightarrow$  er lausnin  $R_l \sim j_l$

fjarri markinu  $r^2 U(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$

verður lausnin (þar gæti ekki verið)

$$R_l(r) = B_l \left\{ h_l^{(2)}(kr) + S_l(k) h_l^{(1)}(kr) \right\}$$

$$\xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{1}{kr} e^{i kr} \dots$$

kúluþylgja inn

$$\frac{1}{kr} e^{-i kr}$$

út

(12)

innþylgjuna mátti skrifa sem

$$e^{i \vec{k} \cdot \vec{r}} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos \theta)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) \left\{ h_l^{(1)}(kr) + h_l^{(2)}(kr) \right\} P_l(\cos \theta)$$

Þessa vegna er heppilegt að velja  
heitdar lausnir fjarri markinu (æðelluna)  
með  $B_l = \frac{1}{2}$  :

$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) \frac{1}{2} \left\{ h_l^{(2)}(kr) + S_l(k) \overset{\substack{\uparrow \\ \text{útþylgja}}}{h_l^{(1)}(kr)} \right\} P_l(\cos \theta)$$

þú þá eru öll áhrif dreifungarinnar  
í  $S_l(k)$



(13)

$$\Psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{l=0}^{\infty} i^{l(2l+1)} \left\{ h_l^{(1)}(kr) + h_l^{(2)}(kr) + (S_l(k) - 1) h_l^{(1)}(kr) \right\} P_l(\cos\theta)$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} i^{l(2l+1)} \left\{ j_l(kr) + \frac{1}{2}(S_l(k) - 1) h_l^{(1)}(kr) \right\} P_l(\cos\theta)$$

$$= e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} + \sum_{l=0}^{\infty} i^{l(2l+1)} \frac{1}{2} (S_l(k) - 1) h_l^{(1)}(kr) P_l(\cos\theta)$$

innbylgja  
planbylgja

kúlbýlgja út

nota aðfella formið

$$h_l^{(1)}(kr) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{1}{kr} e^{i kr - \frac{1}{2}(l+1)\pi}$$

(14)

bera saman við

$$\Psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} + f(k, \theta) \frac{e^{i kr}}{r}$$

fá fast:

$$f(k, \theta) = \frac{i}{2k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) (1 - S_l(k)) P_l(\cos\theta)$$

fjadrandi dreifing.

l-býlgjur blandaðar ekki

↓

líkindæm verða að vandreitast  
fyrir hvert l

↓

radial-flæði fyrir inn og út  
l-pott ~~vandreitast~~ er eins.



(15)

radial fløði  $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$  er náll  
(planbýlgja)

→ radial fløði  $i^l(2l+1)j_l(kr)$   
hverfur líka

$R_l(r)$ : hefur bæði inn og út  
fløði með heitdar fløði 0

Atfella form  $R_l(r)$  notað í

$$0 = \lim_{r \rightarrow \infty} r^2 \frac{1}{2im} \left\{ R_l^* \frac{\partial R_l}{\partial r} - R_l \frac{\partial R_l^*}{\partial r} \right\}$$

leiðir til

$$|S_l(k)|^2 = 1$$

(16)

líka er  $e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}$  radial fløði  
(viðspjald)

→ radial fløði  $i^l(2l+1)j_l(kr)$   
hverfur líka

$$B_l \left\{ h_l^{(2)}(kr) + S_l(k) h_l^{(1)}(kr) \right\}$$

$$= B_l e^{iS_l} \left\{ (j_l - i n_l) e^{-iS_l} + e^{iS_l} (j_l + i n_l) \right\}$$

Atfella form  $R_l(r)$  notað í

$$0 = \lim_{r \rightarrow \infty} r^2 \frac{1}{2im} \left\{ R_l^* \frac{\partial R_l}{\partial r} - R_l \frac{\partial R_l^*}{\partial r} \right\}$$

leiðir til

$$1 = |S_l(k)|^2$$



# Fasavík

(1)

pú er æðlilegt að skilgreina fasavíkið  $S_\ell(k)$ :

$$S_\ell(k) = e^{2i\delta_\ell(k)}, \quad \delta_\ell \in \mathbb{R}$$

venja

Athugum markmáli með  $U(r) = 0 \quad r \geq a$  (endaupg seting). Þá er almennum lausn radial jöfnunar f.  $r > a$

$$R_\ell(r) = A_\ell \left\{ \cos \delta_\ell j_\ell(kr) - \sin \delta_\ell n_\ell(kr) \right\}$$

$$\xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{A_\ell}{kr} \left\{ \cos \delta_\ell \sin(kr - \frac{\ell\pi}{2}) + \sin \delta_\ell \cos(kr - \frac{\ell\pi}{2}) \right\}$$

$$\xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{A_\ell}{kr} \sin(kr - \frac{\ell\pi}{2} + \delta_\ell)$$

innbylgjan var

(2)

$$j_\ell(kr) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{1}{kr} \sin(kr - \frac{\ell\pi}{2})$$

$$\rightarrow \boxed{\text{málið veldur fasavíki}}$$

samtíamt skilgreiningu f.  $(\text{fakt})$

$$f(k, \theta) = \frac{i}{2k} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) (1 - S_\ell(k)) P_\ell(\cos \theta)$$

$$\text{en } 1 - e^{2i\delta_\ell} = -2i e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell$$

$$\rightarrow f(k, \theta) = \frac{1}{k} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell P_\ell(\cos \theta)$$

og þú

$$|f(k, \theta)|^2 = \frac{1}{k^2} \sum_{\ell, \ell'=0}^{\infty} (2\ell+1)(2\ell'+1) \sin \delta_\ell \sin \delta_{\ell'} \cos(\delta_\ell - \delta_{\ell'}) P_\ell(\cos \theta) P_{\ell'}(\cos \theta)$$

2?



ögn með  $l < ka$   
 sér ekki  $V(r)$


ef  $r \geq a$  má sleppa  $V(r)$

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$E_{\text{kin}} \geq E_{\text{orbit}} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2ma^2}$$

$$\rightarrow k^2 a^2 \geq l(l+1) \quad \text{ef } r=a$$

$$\rightarrow \boxed{l < ka}$$



þó svo að  $S_l$  fínist er tvöfalda  
 summan oft erfið  $\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{2} = (\infty)$

$\rightarrow$  athuga þart hve margir líði  
 þart í raun

Í ljós mun koma að aðeins  
 hlutbeygjur með  $l < ka$ , a: seilni mála  
 taka þátt í dreifingunni

Ljósfræðisetningur

finnum hvar þversnið

$$\sigma_t = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

notum

$$\int d\Omega P_l(\cos\theta) P_{l'}(\cos\theta) = \frac{4\pi}{2l+1} \delta_{l,l'}$$



(4)

$$\rightarrow \nabla_t = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 S_l$$

eins má finna  $\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\dots)|^2$

$$\text{Im } f(k, \theta) = \frac{1}{2k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \text{Re}(1 - S_l) P_l(\cos \theta)$$

$$= \frac{1}{2k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) 2 \sin^2 S_l P_l$$

Setjum  $\theta = 0$  og notum  $P_l(1) = 1$

$$\rightarrow \text{Im } f(k, 0) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 S_l$$

sambandur gefur

$$\boxed{\nabla_t = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(k, 0)}$$

$$f(k, \theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i S_l} \sin S_l P_l(\cos \theta)$$

$$|f(k, \theta)|^2 = \frac{1}{k^2} \sum_{l, l'=0}^{\infty} (2l+1)(2l'+1) \sin S_l \sin S_{l'}$$

$$\cos(S_l - S_{l'}) P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta)$$

$$e^{i S_l} \sin S_l = \frac{1 - e^{2i S_l}}{2i}$$

$$= \frac{1 - S(k)}{2i}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \nabla_t$$

notum

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 S_l$$



(5)

→ Imf(k,0) segir til um hversu margir  
eindir dreifast úr inngeislunum

Heildar þversnið

$$\nabla_t = \sum_{l=0}^{\infty} \nabla_l^t$$

$$\rightarrow \nabla_l^t = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l$$

frjórandi áreikstrar  $\rightarrow \delta_l \in \mathbb{R}$

$$\rightarrow \nabla_l^t \leq \frac{4\pi}{k^2} (2l+1)$$

efri mörk næst óðins þegar

$$\delta_l = (n + 1/2)\pi$$

(6)

Demí : Orkubrunnur

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & V_0 > 0 \quad r \leq a \\ 0 & r > a \end{cases}$$

$$K_0^2 = \frac{2m}{\hbar^2} V_0, \quad k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$$

$$K^2 = k^2 + K_0^2$$

Radial jöfnurnar eru

$$\left\{ \frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2} + K^2 \right\} R_l(r) = 0, \quad \underline{r \leq a}$$

$$\left\{ \frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2} + k^2 \right\} R_l(r) = 0, \quad \underline{r > a}$$



(7)

lausnirnar með  $R_\ell(0)$  endanlegt  
og að  $R_\ell(r)$  samsvari föstunum  
flæði fyrir  $r \rightarrow \infty$  eru

$$R_\ell(r) = A_\ell j_\ell(kr) \quad \leftarrow \underline{r \leq a}$$

$$R_\ell(r) = j_\ell(kr) + \frac{1}{2}(S_\ell(k) - 1) \overset{\leftarrow}{h_\ell^{(1)}}(kr) \quad \underline{r > a}$$

úu er  $h_\ell^{(1)} = j_\ell + i n_\ell$ ,  $S_\ell(k) = e^{2i\delta_\ell(k)}$

$$\begin{aligned} \rightarrow R_\ell(r) &= j_\ell + i e^{i\delta} \sin \delta h_\ell \\ &= j_\ell + i e^{i\delta} \sin \delta \cdot (j_\ell + i n_\ell) \\ &= j_\ell (i e^{i\delta} \sin \delta + 1) - e^{i\delta} \sin \delta \cdot n_\ell \\ &= e^{i\delta} \{ j_\ell (e^{-i\delta} + i \sin \delta) - \sin \delta \cdot n_\ell \} \\ &= e^{i\delta_\ell} \{ \cos \delta_\ell \cdot j_\ell(kr) - \sin \delta_\ell \cdot n_\ell(kr) \} \end{aligned}$$

(8)

Skeyta saman lausnum við  $r=a$

$$\frac{K j'_\ell(ka)}{j_\ell(ka)} = \frac{k \{ j'_\ell(ka) \cos \delta_\ell - n'_\ell(ka) \sin \delta_\ell \}}{j_\ell(ka) \cos \delta_\ell - n_\ell(ka) \sin \delta_\ell}$$

$$\rightarrow \tan \delta_\ell = \frac{k j_\ell(ka) j'_\ell(ka) - K j'_\ell(ka) j_\ell(ka)}{k j_\ell(ka) n'_\ell(ka) - K j'_\ell(ka) n_\ell(ka)}$$

athugum árekskur við nýjög lagna orku

$$\rightarrow l=0 \quad s\text{-bylga} \\ \text{er mikilvæg}$$

$$j_0(kr) = \frac{\sin kr}{kr}$$

$$n_0(kr) = -\frac{\cos kr}{kr}$$



(9)

$$\rightarrow \tan S_0 = \frac{k \tan ka - k \tan ka}{K + k \tan ka \cdot \tan ka}$$

$$= \tan \left\{ \arctan \left( \frac{k}{K} \tan ka \right) - ka \right\}$$

$$\rightarrow S_0 = \arctan \left\{ \frac{k}{K} \tan ka \right\} - ka$$

$$\text{Ef } V_0 \rightarrow 0 \quad E \rightarrow 0$$

$$\rightarrow ka \ll 1 \quad ka \ll 1$$

$$\rightarrow S_0 \approx ka \left( \frac{\tan ka}{ka} - 1 \right) \xrightarrow{k \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Ef } E \rightarrow 0 \quad \text{en } V_0 \rightarrow 0$$

$$\rightarrow S_0 \approx ka \left( \frac{\tan ka}{ka} - 1 \right)$$

$$\text{fyrir } ka < \frac{\pi}{2}$$

(10)


þegar  $k$  vex bítar nálgunin

er  $ka \rightarrow \frac{\pi}{2}$ , í raun skiptir  $S_0$  um formarki

$k$  er lítið svo þetta gerist aðeins  
ef  $ka \lesssim \frac{\pi}{2}$

ef  $ka > \frac{\pi}{2}$  þá mun  $S_0 \rightarrow \pi$ ,  $k \rightarrow 0$

$$S_0 = \pi + ka \left( \frac{\tan ka}{ka} - 1 \right)$$



$ka = \frac{\pi}{2}$  : er minnsti styrkur mális  
til þess að hafa eitt  
bundið ástand



Þetta hefur verið alhæft:

Levinsons setningin

Fyrir  $E=0$  er s-fasavæðing

$$S_0(0) = n\pi$$


þar sem  $n$ : er fjöldi s-bandianna  
ástanda

Ef bundna ástandið er ekki stöðugt  
ástand þá gildir

$$S_0(0) = (n + \frac{1}{2})\pi$$

11

**FIGURE 23.10**  
When the phase shift increases through  $\pi/2$  (a), the corresponding partial wave cross section achieves a resonance (b).



The total cross section approaches a maximum value (fig. 23.10). This is called a resonance (see below). If there is a bound state at zero energy and the phase shift goes through  $\pi/2$ , the cross section peaks, and we have a resonance.

#### Breit-Wigner Formula

Let's examine the behavior of a cross section near a resonance. At the resonant energy  $E_r$ , the phase shift increases through  $\pi/2$ , and we have

$$\cos \delta_0(E_r) = 0 \quad \sin \delta_0(E_r) = 1$$

At  $E \sim E_r$ , we can expand  $\sin \delta_0$  and  $\cos \delta_0$  by means of Taylor series:

$$\begin{aligned} \sin \delta_0(E) &= \sin \delta_0(E_r) + \cos \delta_0(E) \left. \frac{d\delta_0(E)}{dE} \right|_{E=E_r} (E - E_r) \\ &= 1 \end{aligned} \quad (23.54)$$



$$\begin{aligned}\cos \delta_0(E) &= \cos \delta_0(E_r) - \sin \delta_0(E) \left. \frac{d\delta_0(E)}{dE} \right|_{E=E_r} (E - E_r) \\ &= - \left. \frac{d\delta_0(E)}{dE} \right|_{E=E_r} (E - E_r) = - \frac{2}{\Gamma} (E - E_r)\end{aligned}\quad (23.55)$$

The last equation defines  $\Gamma$ , which we will interpret a little later. The scattering amplitude is given by

$$f_0(\theta, E) = (1/k) \exp[i\delta_0(E)] \sin \delta_0(E) \quad (23.56)$$

The  $1/k$ -variation with energy is slow and uninteresting. The interesting, rapidly varying part comes from the phase shifts; let's call this part  $f_0(\delta)$ . We have

$$\begin{aligned}f_0(\delta) &= e^{i\delta_0(E)} \sin \delta_0(E) = \frac{\sin \delta_0(E)}{\cos \delta_0(E) - i \sin \delta_0(E)} \\ &\approx \frac{1}{-2(E - E_r)/\Gamma - i} = - \frac{\Gamma/2}{(E - E_r) + i\Gamma/2}\end{aligned}\quad (23.57)$$

where we have used the Taylor-expanded values of  $\cos \delta_0$  and  $\sin \delta_0$ . The total cross section is now given by

$$\sigma_T = \frac{4\pi}{k^2} |f_0(\delta)|^2 = \frac{4\pi}{k^2} \frac{\Gamma^2/4}{(E - E_r)^2 + \Gamma^2/4} \quad (23.58)$$

which is the Breit-Wigner resonance formula (the resonance curve is shown in fig. 23.10b). Clearly,  $\Gamma$  represents the width of the resonant curve.

#### Low-Energy Neutron-Proton Scattering: Scattering Length and Effective Range

Suppose we consider the scattering from a square-well potential with enough depth that there is a bound state with a small binding energy. This is a model for neutron-proton scattering; the neutron-proton system does indeed have a bound state near zero energy, namely deuteron. The square-well treatment of deuteron was given in chapter 12, where we derived the following equation (changing the notation slightly):

$$k'_{in} \cot k'_{in} a = -k_B \quad (12.37)$$

with

$$k'^2_{in} = 2\mu(V_0 - |E|)/\hbar^2 \quad k'^2_B = 2\mu|E|/\hbar^2$$

tímaháð dreifing

öðfella ástönd

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(r)$$

$V(r)$ : skammta séð

$$\rightarrow H \xrightarrow{r \rightarrow \infty} H_0 = \frac{p^2}{2m}$$

gerum ráð fyrir að til séu  
öðfella ástönd

norm í Hilbertrími  
stærk stöðugt

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \|\psi(t) - \psi_{in}(t)\| = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\psi(t) - \psi_{out}(t)\| = 0$$



(2)

$H$  og  $H_0$  eru sjálfoka  
 $\rightarrow$  til eru einoka þróunarvirkjar

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

$$U_0(t) = e^{-iH_0t/\hbar}$$

æfjellu stýrðid verður þá

$$\lim_{t \rightarrow \mp\infty} \| e^{-iHt/\hbar} |\psi(0)\rangle - e^{-iH_0t/\hbar} |\psi_{in/out}(0)\rangle \| = 0$$

þá (einku)

$$\lim_{t \rightarrow \mp\infty} \| e^{+iH_0t/\hbar} e^{-iHt/\hbar} |\psi(0)\rangle - |\psi_{in/out}(0)\rangle \| = 0 \quad (*)$$

(3)

þú þarft að kanna eiginleika  
 Møller-byggingvirkanna

$$\Omega_{\pm}^{\dagger} = \lim_{t \rightarrow \mp\infty} \{ e^{iH_0t/\hbar} e^{-iHt/\hbar} \}$$

samtíðigt (\*) gildir

$$|\psi_{in}(t)\rangle = \Omega_{+}^{\dagger} |\psi(t)\rangle$$

$$|\psi_{out}(t)\rangle = \Omega_{-}^{\dagger} |\psi(t)\rangle$$

og einnig

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \Omega_{+} |\psi_{in}(t)\rangle \\ &= \Omega_{-} |\psi_{out}(t)\rangle \end{aligned}$$



(4)

Ef tækið er samant fest

$$|\psi_{in}(t)\rangle = \Omega_+^\dagger \Omega_+ |\psi_{in}(t)\rangle$$

$$|\psi_{out}(t)\rangle = \Omega_-^\dagger \Omega_- |\psi_{out}(t)\rangle$$

Gerum vott fyrir að inn og út ástand  
spanni allt Hilbert-rúm dreifiástanda.

$$\rightarrow \Omega_\pm^\dagger \Omega_\pm = 1 \quad \text{í dreifi rúminu}$$

Þó er ekki hægt að álitast að  
 $\Omega_\pm$  séu einoka, því ef  $H$  hefur  
bundin ástand þá spanna inn og  
út ástandin ekki allt Hilbert-rúmið.

(5)

## Athugum Schrödingerjöfnuna

$$i\hbar \partial_t |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

$$i\hbar \partial_t |\psi_{in/out}(t)\rangle = H_0 |\psi_{in/out}(t)\rangle \quad (*)$$

$$i\hbar \partial_t \Omega_\pm |\psi_{in/out}(t)\rangle = H \Omega_\pm |\psi_{in/out}(t)\rangle$$

bera saman við (\*)

$$\rightarrow H \Omega_\pm = \Omega_\pm H_0$$

sins ma frá  $|\psi_{out}(t)\rangle = \Omega_-^\dagger |\psi(t)\rangle$   
og  $|\psi(t)\rangle = \Omega_+ |\psi_{in}(t)\rangle$  fá

$$|\psi_{out}(t)\rangle = \Omega_-^\dagger \Omega_+ |\psi_{in}(t)\rangle$$

$$S \equiv \Omega_-^\dagger \Omega_+$$



(6)

S-virkinn tengir aðfella ástönd fyrir  $t = -\infty$  og  $t = \infty$

dreifingin  $\frac{dV}{dE}$  mun tengjast skörum út og inn ástandanna

þú verða allar upplýsingar um dreifinguna í S-virkjanum.

framsætning S-virkjans í grunni frjálstra ástanda er S-fylktid.

Eins hefur mátt þá

$$\begin{aligned} |\psi_{in}(t)\rangle &= \Omega_+^\dagger \Omega_- |\psi_{out}(t)\rangle \\ &= S^\dagger |\psi_{out}(t)\rangle \end{aligned}$$

þar sem  $\{|\psi_{in}\rangle\}$  og  $\{|\psi_{out}\rangle\}$  eru fullkominir grunnar

(7)

$\rightarrow S$  er einota

$$S^\dagger S = S S^\dagger = 1$$

$$\Omega_\pm^\dagger \Omega_\pm = 1 \text{ fyrir dreifi-ástandin}$$

$$H \Omega_\pm = \Omega_\pm H_0 \quad \text{og} \quad S = \Omega_-^\dagger \Omega_+$$

$$\rightarrow H_0 \Omega_\pm^\dagger = \Omega_\pm^\dagger H_0$$

$$\Omega_-^\dagger H \Omega_+ = \Omega_-^\dagger \Omega_+ H_0 = S H_0$$

$$\text{og} \quad H_0 \Omega_-^\dagger \Omega_+ = H_0 S = \Omega_-^\dagger H \Omega_+$$

$$\rightarrow \boxed{S H_0 = H_0 S}$$

$\rightarrow$  fylktisstök S með eigin ástöndum  $H_0$  (frjálsum) eru tænaðhæð



## Greenföll

(8)

$$H = H_0 + V(r)$$

$$H_0 = \frac{p^2}{2m}$$

Skilgreinum Greenföll (tímaháð-tímapróun)

$$(i\hbar\partial_t - H_0)G_0^\pm(t) = \delta(t)$$

$$(i\hbar\partial_t - H)G_1^\pm(t) = \delta(t)$$

með jafarstýrdum

Seinkada:  $G_0^+(t) = G_1^+(t) = 0 \quad t < 0$

Flýttu:  $G_0^-(t) = G_1^-(t) = 0 \quad t > 0$

## Lausnir eru

(9)

$$G_0^+(t) = -\frac{i}{\hbar} e^{-iH_0 t/\hbar} \theta(t)$$

$$G_0^-(t) = \frac{i}{\hbar} e^{-iH_0 t/\hbar} \theta(-t)$$

$$G_1^+(t) = -\frac{i}{\hbar} e^{-iH t/\hbar} \theta(t)$$

$$G_1^-(t) = \frac{i}{\hbar} e^{-iH t/\hbar} \theta(t)$$

$$\theta(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} \theta(0^+) &= 1 \\ \theta(0^-) &= 0 \end{aligned}$$

Lausnirnar tengjast Møller vírðjunum  
og kallast: (propagators)

því ef

$$(i\hbar\partial_t - H_0)|\mathcal{U}_0(t)\rangle = 0$$



(10)

þá fast fyrir  $t > t'$

$$|\psi_0(t)\rangle = i\hbar G_0^+(t-t') |\psi_0(t')\rangle$$

æð ef  $t < t'$

$$|\psi_0(t)\rangle = -i\hbar G_0^-(t-t') |\psi_0(t')\rangle$$

þú eru Möller virðjarnir markgildi  
þessana :

$|\psi(t')\rangle$  er lausn Schrödingerjöfnunnar  
með  $V(r) \neq 0$

skilgreinum

(\*)

$$|\psi_0(t)\rangle = i\hbar G_0^+(t-t') |\psi(t')\rangle$$

fyrir  $t > t'$  þá er  $|\psi_0(t)\rangle$  lausn  
Schrödingerjöfnunnar fyrir  $H_0$

(11)

fyrir  $t = t'$

$$|\psi_0(t')\rangle = |\psi(t')\rangle$$

þú  $\lim_{t \rightarrow 0^+} G_0^+(t) = -\frac{i}{\hbar}$

athugum hvað gerist þegar  $t' \rightarrow -\infty$

Vitum

$$|\psi(t')\rangle = -i\hbar G_1^-(t') |\psi(0)\rangle \quad t' < 0$$

notum i (\*)

$$|\psi_0(t)\rangle = (i\hbar)(-i\hbar) G_0^+(t-t') G_1^-(t') |\psi(0)\rangle$$

$$= e^{-iH_0(t-t')/\hbar} \theta(t-t') e^{-iH_0 t'/\hbar} \theta(-t') |\psi(0)\rangle$$

og þar sem

$$|\psi_0(t)\rangle = e^{-iH_0 t/\hbar} |\psi_0(0)\rangle$$



(12)

→

$$|\psi_0(0)\rangle = \theta(t-t')\theta(-t')e^{iH_0 t'/\hbar} e^{-iH t'/\hbar} |\psi(0)\rangle$$

$$t' \rightarrow -\infty$$

$$\rightarrow |\psi_0(0)\rangle = \Omega_+^+ |\psi(0)\rangle$$

$$\rightarrow |\psi_0(t)\rangle = |\psi_{in}(t)\rangle$$

og þá

$$|\psi_0(t)\rangle = i\hbar G_0^+(t-t') |\psi(t')\rangle$$

↖ lausn á Sch H

### Heildisjafna

Hógt er ót finna heildisjöfnur fyrir  $G^\pm(t)$  sem felldi af  $G_0^\pm(t)$

Notum t.d.

$$(i\hbar\partial_t - H_0)G^+(t) = \delta(t) + VG^+(t)$$

$$(i\hbar\partial_t - H_0)G_0^+(t) = \delta(t)$$

(13)

drögum þá sýðari frá þeirri fyrri

$$\rightarrow i\hbar\partial_t \{G^+(t) - G_0^+(t)\} = H_0 \{G^+(t) - G_0^+(t)\} + VG^+(t)$$

með innsetningu má samræyna

lausnin er

$$\{G^+(t) - G_0^+(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} G_0^+(t-t')VG^+(t')dt'$$

$$\rightarrow G^\pm(t) = G_0^\pm(t) + \int_{-\infty}^{\infty} G_0^+(t-t')VG^+(t')dt'$$

jafna á Dyson formi

Fourier ummyndunin m. t.-t.  $t$   
getur Lippmann-Schwinger jöfnuna

þegar  $G$  verður á  $|\psi\rangle$



(14)

$$(i\hbar\partial_t - H_0)|\psi\rangle = V|\psi\rangle$$

låt oss betrakta jämvikt av  $|\psi\rangle$

$$\rightarrow |\psi^\pm(t)\rangle = |\psi_{in/out}^\pm(t)\rangle + \int_{-\infty}^{\infty} G_0^\pm(t-t') V |\psi^\pm(t')\rangle dt'$$

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} |\psi^\pm(t)\rangle = |\psi_{in/out}^\pm(t)\rangle$$

er invariant i jämvikt


> Källén - Yang - Feldman lemma

(15)

## S-matris och driftvisirum

$$|\psi_{in}\rangle = S^\dagger |\psi_{out}\rangle$$

$$|\psi_{out}\rangle = S |\psi_{in}\rangle$$



$\alpha$  merkar verkja som växlar vid  $H_0$   
en ekki  $H$

$\Gamma$   $|\psi^+(\alpha, t)\rangle$  merkar  $\alpha$  lönungis  
hvernig  $\alpha$  ständid vord til ur  $|\psi_{in}\rangle$



(16)

Vit viljum finna ( $i$  tilraum)  
 líkindi þess að  $|\psi_0(\beta, t)\rangle$  þróist  
 úr  $|\psi^+(\alpha, t)\rangle$  eftir langum tíma

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle \psi_0(\beta, t) | \psi^{(+)}(\alpha, t) \rangle$$

$$= \langle \psi_0(\beta, t) | \psi_{\text{out}}(t) \rangle$$

$$= \langle \psi_0(\beta, t) | S | \psi_{\text{in}}(t) \rangle$$

$$= \langle \psi_0(\beta, t) | S | \psi_0(\alpha, t) \rangle$$

á sama hátt hefði mátt spyrja  
 hvernig  $|\psi_{\text{out}}(t)\rangle$  tengist  $|\psi^-(\beta, t)\rangle$   
 og þ. tengist

$$\langle \psi_0(\beta, t) | S | \psi_0(\alpha, t) \rangle = \langle \psi^-(\beta, t) | \psi^+(\alpha, t) \rangle$$

(17)

Lippmann-Schwinger

$$\rightarrow |\psi^{(\pm)}\rangle = |\psi^{(0)}\rangle + (E - H \pm i\epsilon)^{-1} V |\psi^{(0)}\rangle$$

$$\begin{aligned} \beta &\rightarrow E_f & \langle E - H | \psi^{\pm} \rangle &= \langle E - H_0 | \psi^0 \rangle \\ \alpha &\rightarrow E_i & &= \langle E - H + V | \psi^0 \rangle = \langle E - H | \psi^0 \rangle + V | \psi^0 \rangle \end{aligned}$$

$$\rightarrow S_{fi} = \langle \psi^-(E_f) | \psi^+(E_i) \rangle$$

$$= \langle \psi^+(E_f) | \psi^+(E_i) \rangle$$

$$+ \left\{ \langle \psi^-(E_f) | - \langle \psi^+(E_f) | \right\} \psi^+(E_i) \rangle$$

$$\rightarrow |\psi^-(E_f)\rangle - |\psi^+(E_f)\rangle = \left\{ \frac{1}{E_f - H - i\epsilon} V - \frac{1}{E_f - H + i\epsilon} V \right\} |\psi_{(E_f)}^0\rangle$$

gerum ráð fyrir

$$\langle \psi^{\pm}(E_f) | \psi^{\pm}(E_i) \rangle = S_{fi} = \delta(E_f - E_i) \delta_{\alpha\beta}$$

↑ kommerk eining - gæm



(18)

→

$$S_{fi} = S_{fi} + \langle \psi^0(E_f) | V \frac{1}{E_f - H + i\epsilon} - V \frac{1}{E_f - H - i\epsilon} | \psi^+(E_i) \rangle$$

$$= S_{fi} + \left\{ \frac{\mathcal{P}}{E_f - E_i} - i\pi \delta(E_f - E_i) - \frac{\mathcal{P}}{E_f - E_i} - i\pi \delta(E_f - E_i) \right\} \langle \psi^0(E_f) | V | \psi^+(E_i) \rangle$$

$$\rightarrow S_{fi} = S_{fi} - 2\pi i \delta(E_f - E_i) \langle \psi^0(E_f) | V | \psi^+(E_i) \rangle$$

so

$$S_{fi} = S_{fi} - 2\pi i \delta(E_f - E_i) T_{fi}$$

$$T_{fi} = \langle \psi^{(0)}(E_f) | V | \psi^+(E_i) \rangle$$

$\uparrow$   
 $E_f = E_i$

$$\rightarrow f(k\theta) = -\frac{1}{4\pi} T_{fi}$$